Dénes-féle Szimmetrikus prímszám tétel alkalmazása annak bizonyítására, hogy *létezik végtelen sok n^2+1 alakú prímszám*

Dénes Tamás matematikus-kriptográfus
Email: tdenest@freemail.hu

Abstract

A [Dénes 2017] dolgozatban bizonyított Dénes-féle Szimmetrikus prímszám tétel felhasználásával bebizonyítjuk, hogy *létezik végtelen sok n^2+1 alakú prímszám*.

----- . -----

1. Definíció *(szimmetrikus prímpár)*

Legyenek $N \geq 4$ és $0 \leq m_N \leq N/2$ természetes számok. Ha $p_{N-} = N - m_N$ és $p_{N+} = N + m_N$ prímszámok, akkor ezeket *N*-re *szimmetrikus prímpárnak* nevezzük.

1. Tétel

Bármely két p és q prímszámhoz létezik N és m_N természetes szám, hogy p és q N-re szimmetrikus prímpár.

BIZONYÍTÁS

A [Dénes 2002] dolgozatban bizonyított 1. tétel szerint, ha p és q prímek, akkor $p=6k\pm1$ és $q=6r\pm1$ alakú, ahol k és r természetes számok. Tehát a következő esetek állhatnak elő, amelyek az $N = \frac{p+q}{2}$ értékre mindig természetes számok:

(1) $$N = \frac{p+q}{2} = \frac{(6k+1)+(6r+1)}{2} = \frac{6(k+r)+2}{2} = 3(k+r)+1 \quad (k=1,2,3,\ldots),\ (r=1,2,3,\ldots)$$

(2) $$N = \frac{p+q}{2} = \frac{(6k+1)+(6r-1)}{2} = \frac{6(k+r)}{2} = 3(k+r) \quad (k=1,2,3,\ldots),\ (r=1,2,3,\ldots)$$

(3) $$N = \frac{p+q}{2} = \frac{(6k-1)+(6r+1)}{2} = \frac{6(k+r)}{2} = 3(k+r) \quad (k=1,2,3,\ldots),\ (r=1,2,3,\ldots)$$

(4) $$N = \frac{p+q}{2} = \frac{(6k-1)+(6r-1)}{2} = \frac{6(k+r)-2}{2} = 3(k+r)-1 \quad (k=1,2,3,\ldots),\ (r=1,2,3,\ldots)$$

Válasszuk az (1)-(4)-ben kiszámított N értékekhez a következő m_N értékeket:

(5) $$m_N = \frac{|p-q|}{2} = \frac{|(6k+1)-(6r+1)|}{2} = \frac{6|(k-r)|}{2} = 3|(k-r)| \quad (k=1,2,\ldots),\ (r=1,2,\ldots)$$

(6) $$m_N = \frac{|p-q|}{2} = \frac{|(6k+1)-(6r-1)|}{2} = \frac{6|(k-r)|+2}{2} = 3|(k-r)|+1 \quad (k=1,2,\ldots),\ (r=1,2,\ldots)$$

(7) $$m_N = \frac{|p-q|}{2} = \frac{|(6k-1)-(6r+1)|}{2} = \frac{6|(k-r)|-2}{2} = 3|(k-r)|-1 \quad (k=1,2,\ldots),\ (r=1,2,\ldots)$$

Dénes Tamás *matematikus-kriptográfus* Email: tdenest@freemail.hu

(8) $m_N = \frac{|p-q|}{2} = \frac{|(6k-1)-(6r-1)|}{2} = \frac{6|(k-r)|}{2} = 3|(k-r)|$ $(k=1,2,\ldots)$, $(r=1,2,\ldots)$

Az (1)-(4) és (5)-(8) összefüggésekből kapjuk:

(9)
$$\begin{aligned} N - m_N &\overset{(1),(5)}{=} 3(k+r)+1-3(k-r) = 6r+1 = q \\ N + m_N &\overset{(1),(5)}{=} 3(k+r)+1+3(k-r) = 6k+1 = p \end{aligned}$$ $(k=1,2,3,\ldots)$, $(r=1,2,3,\ldots)$

(10)
$$\begin{aligned} N - m_N &\overset{(2),(6)}{=} 3(k+r)-(3(k-r)+1) = 6r-1 = q \\ N + m_N &\overset{(2),(6)}{=} 3(k+r)+(3(k-r)+1) = 6k+1 = p \end{aligned}$$ $(k=1,2,3,\ldots)$, $(r=1,2,3,\ldots)$

(11)
$$\begin{aligned} N - m_N &\overset{(3),(7)}{=} 3(k+r)-(3(k-r)-1) = 6r+1 = q \\ N + m_N &\overset{(3),(7)}{=} 3(k+r)+(3(k-r)-1) = 6k-1 = p \end{aligned}$$ $(k=1,2,3,\ldots)$, $(r=1,2,3,\ldots)$

(12)
$$\begin{aligned} N - m_N &\overset{(4),(8)}{=} 3(k+r)-1-3(k-r) = 6r-1 = q \\ N + m_N &\overset{(4),(8)}{=} 3(k+r)-1+3(k-r) = 6k-1 = p \end{aligned}$$ $(k=1,2,3,\ldots)$, $(r=1,2,3,\ldots)$

A (9)-(12) összefüggések pontosan eleget tesznek a [Dénes 2017]-ben bizonyított Dénes-féle Szimmetrikus prímszám tételnek.

Q.E.D.

Az 1. Tétel következménye a következő 2. Tétel:

2. Tétel

Bármely p prímszámhoz létezik N és m_N természetes szám, hogy $p=N-m_N$ és $q=N+m_N$ prímszám.

----- . -----

A következő 3. Tétel bizonyításához felhasználjuk az alábbi ismert összefüggést:

(13) $$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = 2\left(\sum_{i=1}^{n} i\right) - n = \frac{2n(n-1)}{2} - n = 1+3+5+\ldots+(2n-3)+(2n-1) = n^2$$

Ebből következik, hogy

(14) $$\frac{2n(n-1)-2n}{2}+1 = 2n\cdot\frac{n}{2}+1 = 1+3+5+\ldots+(2n-3)+2n = n^2+1$$

Dénes Tamás *matematikus-kriptográfus* Email: tdenest@freemail.hu

3. Tétel

Létezik végtelen sok $p=n^2+1$ alakú prímszám.

Bizonyítás (indirekt)

Tegyük fel, hogy N az utolsó természetes szám, amelyre $p=N^2+1$ prímszám.
Mivel p prímszám, így N^2+1 páratlan, ezért elegendő a bizonyítást csak páros $n>N$-re vizsgálni. Ekkor az indirekt feltétel így írható fel:

(15) $$\forall c \geq 1 \quad \Rightarrow \quad q = (\underbrace{N+2c}_{n})^2 + 1$$ ***nem prímszám*** (c egész szám)

(16) $$q = (\underbrace{N+2c}_{n})^2 + 1 = \underbrace{N^2+1}_{p} + 4Nc + 4c^2 = p + 4c(N+c)$$

Ekkor a fenti 2. Tétel szerint létezik olyan c természetes szám, amelyre

(17) $$m_p = 2c(N+c) \quad \Rightarrow \quad q = p + 2m_p \overset{(16)}{=} (\underbrace{N+2c}_{n \rangle N})^2 + 1$$ *prímszám* (lásd az 1. ábrát)



1. ábra

Ez azonban ellentmond a (15) indirekt feltevésnek.

Q.E.D.

Dénes Tamás *matematikus-kriptográfus* Email: tdenest@freemail.hu

Az első tíz és az első néhány 1 milliónál nagyobb n^2+1 alakú prímszám fentiek szerinti kiszámítását mutatja be az 1. Táblázat.

1. Táblázat

N	$p=N^2+1$	c	$m_p=2c(N+c)$	$q=p+2m_p$	$q=(N+2c)^2+1$	*Szimmetr. prímek*
2	**5** prím	**1**	***6***	17	**17** prím	*
4	**17** prím	**1**	***10***	37	**37** prím	*
6	37 prím	1	14	65	65=5x13	
6	**37** prím	**2**	***32***	101	**101** prím	*
10	101 prím	1	22	145	145=5x29	
10	**101** prím	**2**	***48***	197	**197** prím	*
14	**197** prím	**1**	***30***	257	**257** prím	*
16	257 prím	1	34	325	$325=5^2$x13	
16	**257** prím	**2**	***72***	401	**401** prím	*
20	401 prím	1	42	485	485=5x97	
20	**401** prím	**2**	***88***	577	**577** prím	*
24	**577** prím	**1**	***50***	677	**677** prím	*
26	677 prím	1	54	785	785=5x157	
26	677 prím	2	112	901	901=17x53	
26	677 prím	3	174	1.025	$1.025=5^2$x41	
26	677 prím	4	240	1.157	1.157=13x89	
26	**677** prím	**5**	***310***	1.297	**1.297** prím	*
36	1.297 prím	1	74	1.445	$1.445=5x17^2$	
36	**1.297** prím	**2**	***152***	1.601	**1.601** prím	*
. . .						
1.004	1.008.017 prím	1	2.010	1.012.037	1.012.037	
1.004	1.008.017 prím	2	4.024	1.016.065	1.016.065=5x203.213	
1.004	**1.008.017** prím	**3**	***6.042***	1.020.101	**1.020.101** prím	*
1.010	1.020.101 prím	1	2.022	1.024.145	1.024.145=5x257x797	
1.010	1.020.101 prím	2	4.048	1.028.197	1.028.197=109x9.433	
1.010	1.020.101 prím	3	6.078	1.032.257	1.032.257=17x41x1.481	
1.010	1.020.101 prím	4	8.112	1.036.325	$1.036.325=5^2$x41.453	
1.010	1.020.101 prím	5	10.150	1.040.401	1.040.401=101x10.301	
1.010	1.020.101 prím	6	12.192	1.044.485	1.044.485=5x13x16.069	
1.010	1.020.101 prím	7	14.238	1.048.577	1.048.577=17x61.681	
1.010	1.020.101 prím	8	16.288	1.052.677	1.052.677=61x17.257	
1.010	1.020.101 prím	9	18.342	1.056.785	1.056.785=5x241x877	
1.010	1.020.101 prím	10	20.400	1.060.901	1.060.901=37x53x541	
1.010	1.020.101 prím	11	22.462	1.065.025	$1.065.025=5^2$x13x29x113	
1.010	1.020.101 prím	12	24.528	1.069.157	1.069.157=41x89x293	
1.010	**1.020.101** prím	**13**	***26.598***	1.073.297	**1.073.297** prím	*

Dénes Tamás *matematikus-kriptográfus* Email: tdenest@freemail.hu

Hivatkozások

[Dénes 2002] Dénes, Tamás: *Complementary prime-sieve*,
PUre Mathematics and Applications, Vol.12 (2002), No. 2, pp. 197-207
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/KomplementerPrimszita.pdf

[Dénes 2017] Dénes, Tamás: *Dénes type Symmetric Prime Number theorem and its application to proof of the Even Goldbach conjecture*,
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-SzimmPrimTetel.pdf
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-SymmPrime-theorem.pdf